


РЕЦИДИВУЮЧИЙ БІЛЬ В ЖИВОТІ ЯК СИМПТОМ САН

Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – рідкісне автосомно-домінантне генетичне захворювання з поширеністю 1 випадок на 50 000 людей¹.




Провідними симптомами у педіатричних пацієнтів є⁶:

- Набряк стінки кишечника та пов'язані з ним симптоми колікоподібного болю в животі
- Нудота
- Блювання
- Водяниста діарея після нападу

В дослідженні 2014 року серед пацієнтів з САН, які відчували напади з будь-якими абдомінальними симптомами:



До **93%** пацієнтів мали залучення шлунково-кишкового тракту з подальшим болем у животі¹⁻³



До **80%** усіх пацієнтів мали періодичний біль у животі¹⁻³



49% нападів характеризувалися ізольованим болем в животі⁴



Ще у **33%** нападів пацієнтів мали біль в животі та симптоми іншої локалізації за межами черевної порожнини⁴



Важливо зібрати **повний сімейний анамнез** і дізнатися про особистий **анамнез набряків усіх локалізацій** та особливо симптоми набряку дихальних шляхів⁵



При САН рецидивуючий біль у животі може відрізнятися за ступенем тяжкості, але зазвичай виникає у вигляді **тяжких періодичних епізодів**, що **тривають 2-5 днів** за відсутності лікування, з нормальними безсимптомними періодами між нападами⁵



У разі анамнезу ангіоневротичних набряків – відсутність відповіді на глюкокортикоїди, антигістамінні препарати або адреналін є додатковою ознакою спадкового ангіоневротичного набряку⁵

**ДІАГНОСТИКА
ТА ЛІКУВАННЯ
САН В УКРАЇНІ Є!**

**ПРИ ПІДОЗРІ НА САН
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕ
ПАЦІЄНТА В ІМУНОЛОГА!**



**ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО
АБДОМІНАЛЬНИЙ БІЛЬ ПРИ САН
ЗА ПОСИЛАННЯМ QR-КОДУ**

1. Agostoni A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;114 (Suppl). 2. Frank M, et al. Ann Intern Med. 1976;84:580-93. 3. Winnewisser J, et al. J Intern Med. 1997;241:39-46. 4. Rubinstein E, et al. BMC Gastroenterol. 2014;14:71. 5. Staller K, et al. J Clin Gastroenterol. 2022;56:740-747. Farkas, H et al. "International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency." Allergy vol. 72,2 2017

© ТОВ «Такеда Україна» 2024. Всі права захищені.

«ТАКЕДА» та  є зареєстрованими торговельними марками компанії «Takeda Pharmaceutical Company Limited»

ТОВ «Такеда Україна», вул. Солом'янська, 11, БЦ Eleven, 11-й поверх,
03110, Київ, Україна, Тел.: +380 44 390 09 09. Факс: +380 44 390 29 29.
E-mail: ua-info@takeda.com

